



## Bijlage 1; Vragenlijst 'Wijkverpleegkundigen en medicatie'

### Demografische gegevens

1.	Wat is uw geslacht?
	<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw

2.	Wat is uw leeftijd
	<input type="text" value="18"/>

3.	Wat is uw hoogst afgeronde opleiding(sniveau)?
	<input type="checkbox"/> Inservice <input type="checkbox"/> MBO <input type="checkbox"/> HBO <input type="checkbox"/> Universitair <input type="checkbox"/> Anders namelijk,

4.	Hoeveel jaren ervaring heeft u sinds de afronding van uw opleiding?
	<input type="text" value="1"/>

## Kennis

**5.** Sinds kort krijgt mevrouw A. de volgende geneesmiddelen (i.v.m. hartfalen): furosemide (Lasix®) en digoxine (Lanoxin®). Mevrouw heeft een hele rij klachten. Welke kunnen veroorzaakt worden door (één van) de geneesmiddelen? Welk van de onderstaande antwoorden is/ zijn goed?



- |                          |                                 |                          |                    |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1. hoofdpijn                    | <input type="checkbox"/> | 2. duizeligheid    |
| <input type="checkbox"/> | 3. wazig zien                   | <input type="checkbox"/> | 4. veel dromen     |
| <input type="checkbox"/> | 5. koude handen en voeten       | <input type="checkbox"/> | 6. maagpijn        |
| <input type="checkbox"/> | 7. moeheid en vergeetachtigheid | <input type="checkbox"/> | 8. huiduitslag     |
| <input type="checkbox"/> | 9. veel plassen                 | <input type="checkbox"/> | 10. bronchospasmen |

**6.** Mevrouw A krijgt last van depressieve klachten. De buurvrouw raadt haar St-Janskruid (Kira®-dragees, hypericum) aan. Dat is plantaardig en kan dus geen kwaad. Het heeft de buurvrouw ook erg goed geholpen.





- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1. baat het niet, het schaadt ook niet.                         |
| <input type="checkbox"/> | 2. st.Janskruid heeft invloed op de werking van geneesmiddelen. |


**7.** Meneer B. heeft last van slapeloosheid. Dokter schrijft het slaapmiddel temazepam (Normison®) in een lage dosering voor. Maar het helpt niet echt. De slapeloosheid wordt erger en hij wordt erg rusteloos en prikkelbaar. Welk van onderstaande antwoorden is/zijn goed?





- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 1. dosering temazepam verhogen                                     |
| <input type="checkbox"/> | 2. doorgaan, het duurt altijd even, voordat een geneesmiddel werkt |
| <input type="checkbox"/> | 3. stoppen met temazepam.  |


<b>8.</b>	Mevrouw C. heeft al jaren last van hoofdpijn. Ze slikt daarvoor dagelijks een paar tabletjes paracetamol (gemiddeld 3 per dag). Ze krijgt nu acetylsalicylzuur 80 mg voorgeschreven ('s morgens 1 tablet) , maar wil dat niet innemen. Dat aspirientje is immers niet nodig, ze slikt al paracetamol. Welk van onderstaande antwoorden is/zijn goed?
	<input type="checkbox"/> 1.mevrouw heeft gelijk. <input type="checkbox"/> 2.mevrouw kan het beter wel slikken, want de acetylsalicylzuur is ergens anders voor. <input type="checkbox"/> 3.mevrouw kan beter stoppen met de paracetamol, want misschien wordt de hoofdpijn daar wel door veroorzaakt. <input type="checkbox"/> 4.mevrouw kan de acetylsalicylzuur slikken in plaats van de paracetamol, maar dan wel meer tabletten op een dag.


<b>9.</b>	Meneer D. slikt sinds enige tijd digoxine Lanoxin®. De laatste dagen heeft hij erg veel last van zijn maag. Daarom slikt hij bij elke maaltijd een Rennie®. Welk van onderstaande antwoorden is/zijn goed?
	<input type="checkbox"/> 1.rennie kan de werking van de digoxine versterken. <input type="checkbox"/> 2.rennie kan de werking van de digoxine verminderen . <input type="checkbox"/> 3.maagpijn kan een bijwerking van digoxine zijn.


<b>10.</b>	Mevr E.slikt al 2 jaar oxazepam (Seresta®). Sinds een week krijgt ze ook furosemide (Lasix®). Ze is de afgelopen ochtenden al een paar keer bijna gevallen. Welk van de mogelijke oorzaken zijn goed?
	<input type="checkbox"/> a.oxazepam <input type="checkbox"/> b.furosemide <input type="checkbox"/> c.door de combinatie van deze twee geneesmiddelen


<b>11.</b>	Dhr F. slikt al enkele jaren furosemide (Lasix®). Hij klaagt, dat hij de laatste tijd erg veel moet plassen. Bij navraag blijkt, dat hij veel drinkt vanwege dorst.
	<input type="checkbox"/> 1.Dit is normaal, want furosemide is een plastablet. <input type="checkbox"/> 2.Meneer kan diabetes hebben.


<b>12.</b>	<p>Mevr G. slikt al een aantal jaar metoprolol (Selokeen®, Lopresor®) voor de hoge bloeddruk. Daarmee is de bloeddruk goed onder controle.</p> <p>Een week of vier geleden is ze gevallen en sinds die tijd heeft ze last van haar schouder. Op aanraden van de buurvrouw slikt ze ibuprofen (Nurofen®, Advil®) en dat helpt goed. De ibuprofen haalt ze bij de drogist.</p> <p>Gisteren, bij de halfjaarlijkse bloeddrukcontrole bij de huisarts, bleek haar bloeddruk te hoog te zijn.</p>				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 1.de werking van de metoprolol wordt minder als je het lang slikt.</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 2.de ibuprofen heeft een negatieve invloed op de werking van metoprolol.</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> 1.de werking van de metoprolol wordt minder als je het lang slikt.		<input type="checkbox"/> 2.de ibuprofen heeft een negatieve invloed op de werking van metoprolol.
	<input type="checkbox"/> 1.de werking van de metoprolol wordt minder als je het lang slikt.				
	<input type="checkbox"/> 2.de ibuprofen heeft een negatieve invloed op de werking van metoprolol.				


<b>13.</b>	<p>Meneer H. slikt metoprolol (Selokeen®, Lopresor®) i.v.m. hypertensie. Hij heeft een aantal klachten. Welke klachten kunnen veroorzaakt worden door metoprolol? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.</p>																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 1. hoofdpijn</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 2. duizeligheid</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 3. wazig zien</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 4. veel dromen</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 5. koude handen en voeten</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 6. maagpijn</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 7. moeheid en vergeetachtigheid</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 8. huiduitslag</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 9. veel plassen</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 10. bronchospasmen</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> 1. hoofdpijn		<input type="checkbox"/> 2. duizeligheid		<input type="checkbox"/> 3. wazig zien		<input type="checkbox"/> 4. veel dromen		<input type="checkbox"/> 5. koude handen en voeten		<input type="checkbox"/> 6. maagpijn		<input type="checkbox"/> 7. moeheid en vergeetachtigheid		<input type="checkbox"/> 8. huiduitslag		<input type="checkbox"/> 9. veel plassen		<input type="checkbox"/> 10. bronchospasmen
	<input type="checkbox"/> 1. hoofdpijn		<input type="checkbox"/> 2. duizeligheid																		
	<input type="checkbox"/> 3. wazig zien		<input type="checkbox"/> 4. veel dromen																		
	<input type="checkbox"/> 5. koude handen en voeten		<input type="checkbox"/> 6. maagpijn																		
	<input type="checkbox"/> 7. moeheid en vergeetachtigheid		<input type="checkbox"/> 8. huiduitslag																		
	<input type="checkbox"/> 9. veel plassen		<input type="checkbox"/> 10. bronchospasmen																		


<b>14.</b>	<p>Mevr. I. slikt al een tijdje furosemide (Lasix®) vanwege vocht in enkels en voeten. Onlangs heeft de specialist de dosering verhoogd, omdat het onvoldoende werkzaam was. Nu klaagt mevrouw over pijnlijke tenen. Bij inspectie blijken de gewrichten rood en ontstoken te zijn. Welk van onderstaande antwoorden is/ zijn goed?</p>						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 1.dit is een gevolg van de aandoening</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 2.dit wijst op een overdosering van furosemide</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 3.dit is een bijwerking van furosemide</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> 1.dit is een gevolg van de aandoening		<input type="checkbox"/> 2.dit wijst op een overdosering van furosemide		<input type="checkbox"/> 3.dit is een bijwerking van furosemide
	<input type="checkbox"/> 1.dit is een gevolg van de aandoening						
	<input type="checkbox"/> 2.dit wijst op een overdosering van furosemide						
	<input type="checkbox"/> 3.dit is een bijwerking van furosemide						

<b>15.</b>	<p>Meneer J. is astma-patient en gebruikt daarvoor twee verschillende geneesmiddelen per inhalatie.</p> <p>Recent is hoge bloeddruk geconstateerd en de huisarts heeft daarvoor metoprolol voorgeschreven. Meneer gebruikt sinds een paar dagen zijn astmamiddelen vaker dan daarvoor. Welk van onderstaande antwoorden is/ zijn goed?</p>						
	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1.hoge bloeddruk is een bijwerking van de astma-middelen.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2.metoprolol heeft als bijwerking benauwdheid.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>3.De astmamiddelen werken niet goed meer, omdat meneer het al lang gebruikt.</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	1.hoge bloeddruk is een bijwerking van de astma-middelen.	<input type="checkbox"/>	2.metoprolol heeft als bijwerking benauwdheid.	<input type="checkbox"/>	3.De astmamiddelen werken niet goed meer, omdat meneer het al lang gebruikt.
<input type="checkbox"/>	1.hoge bloeddruk is een bijwerking van de astma-middelen.						
<input type="checkbox"/>	2.metoprolol heeft als bijwerking benauwdheid.						
<input type="checkbox"/>	3.De astmamiddelen werken niet goed meer, omdat meneer het al lang gebruikt.						


<b>16.</b>	<p>Mevrouw K. is astmapatient. Ze kan niet tegen aspirine, daar krijgt ze benauwheidsaanvallen van. Mag mevrouw acetylsalicylzuur 30 mg slikken, (voorgeschreven na een TIA)?</p>				
	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1.ja, in zo'n lage dosering kan dat wel.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2.nee, dat kan weer aanvallen uitlokken.</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	1.ja, in zo'n lage dosering kan dat wel.	<input type="checkbox"/>	2.nee, dat kan weer aanvallen uitlokken.
<input type="checkbox"/>	1.ja, in zo'n lage dosering kan dat wel.				
<input type="checkbox"/>	2.nee, dat kan weer aanvallen uitlokken.				


<b>17.</b>	<p>Meneer L. slikt furosemide (Lasix®)i.v.m. hartfalen. Zijn conditie is stabiel. Meneer heeft de laatste tijd last van zijn knieën. Daarvoor slikt hij ibuprofen, wat hij bij de drogist haalt. Daarmee zijn de klachten redelijk onder controle.</p> <p>Sinds enkele dagen klaagt hij over benauwdheid. Bij inspectie blijken zijn enkels opgezwollen te zijn. Welk van onderstaande antwoorden is/ zijn goed?</p>										
	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1.De werking van furosemide wordt minder als je het lang slikt</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2.De knie-klachten zijn een bijwerking van furosemide.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>3.De benauwdheid is een bijwerking van furosemide.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4.De benauwdheid is een bijwerking van ibuprofen.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5.Ibuprofen vermindert de werking van furosemide.</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	1.De werking van furosemide wordt minder als je het lang slikt	<input type="checkbox"/>	2.De knie-klachten zijn een bijwerking van furosemide.	<input type="checkbox"/>	3.De benauwdheid is een bijwerking van furosemide.	<input type="checkbox"/>	4.De benauwdheid is een bijwerking van ibuprofen.	<input type="checkbox"/>	5.Ibuprofen vermindert de werking van furosemide.
<input type="checkbox"/>	1.De werking van furosemide wordt minder als je het lang slikt										
<input type="checkbox"/>	2.De knie-klachten zijn een bijwerking van furosemide.										
<input type="checkbox"/>	3.De benauwdheid is een bijwerking van furosemide.										
<input type="checkbox"/>	4.De benauwdheid is een bijwerking van ibuprofen.										
<input type="checkbox"/>	5.Ibuprofen vermindert de werking van furosemide.										


<b>18.</b>	Mevrouw M. slikt digoxine (Lanoxin®) i.v.m. hartfalen. Voor haar maagklachten slikt mevrouw Ultacid® (een zuurbindend middel). Na een paar dagen is ze meer benauwd en krijgt ze dikke enkels. Welk van onderstaande antwoorden is/ zijn goed?
	<input type="checkbox"/> 1. dit is een bijwerking van digoxine. <input type="checkbox"/> 2. dit is een bijwerking van Ultacid®. <input type="checkbox"/> 3. ultacid® vermindert de werking van digoxine.

<b>19.</b>	Van de huisarts moet mevrouw M. stoppen met de Ultacid®. Hij schrijft haar omeprazol (Losec®) voor. Welk van onderstaande antwoorden is/ zijn goed?
	<input type="checkbox"/> 1. een goed idee. <input type="checkbox"/> 2. geen goed idee, omeprazol kan de bloedspiegel van digoxine verlagen. <input type="checkbox"/> 3. geen goed idee, omeprazol kan de bloedspiegel van digoxine verhogen.

<b>20.</b>	Meneer N. krijgt omeprazol (Losec®) voorgeschreven voor zuurbranden. Welke bijwerkingen kan omeprazol geven? Welk van onderstaande antwoorden is/ zijn goed?										
	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1. hoofdpijn</td> <td><input type="checkbox"/> 2. duizeligheid</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3. wazig zien</td> <td><input type="checkbox"/> 4. veel dromen</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 5. koude handen en voeten</td> <td><input type="checkbox"/> 6. maagpijn</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 7. moeheid en vergeetachtigheid</td> <td><input type="checkbox"/> 8. huiduitslag</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 9. veel plassen</td> <td><input type="checkbox"/> 10. bronchospasmen</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 1. hoofdpijn	<input type="checkbox"/> 2. duizeligheid	<input type="checkbox"/> 3. wazig zien	<input type="checkbox"/> 4. veel dromen	<input type="checkbox"/> 5. koude handen en voeten	<input type="checkbox"/> 6. maagpijn	<input type="checkbox"/> 7. moeheid en vergeetachtigheid	<input type="checkbox"/> 8. huiduitslag	<input type="checkbox"/> 9. veel plassen	<input type="checkbox"/> 10. bronchospasmen
<input type="checkbox"/> 1. hoofdpijn	<input type="checkbox"/> 2. duizeligheid										
<input type="checkbox"/> 3. wazig zien	<input type="checkbox"/> 4. veel dromen										
<input type="checkbox"/> 5. koude handen en voeten	<input type="checkbox"/> 6. maagpijn										
<input type="checkbox"/> 7. moeheid en vergeetachtigheid	<input type="checkbox"/> 8. huiduitslag										
<input type="checkbox"/> 9. veel plassen	<input type="checkbox"/> 10. bronchospasmen										


<b>21.</b>	Mevrouw O. krijgt sinds kort furosemide (Lasix®) voorgeschreven. Ze is al een paar keer gevallen. Kan dit te maken hebben met furosemide?
	<input type="checkbox"/> 1. ja, furosemide kan kaliumspiegel verlagen en dat kan spierzwakte veroorzaken. <input type="checkbox"/> 2. ja, door sterke dehydratie kan mevrouw verward raken. <input type="checkbox"/> 3. ja, door sterke bloeddrukdaling kan mevrouw duizelig worden. <input type="checkbox"/> 4. nee, dat moet een andere oorzaak hebben.


<b>22.</b>	Meneer P. heeft last van depressieve klachten. Hij is erg teruggetrokken en komt bijna de deur niet meer uit. Hij slikt metoprolol (Selokeen®, Lopresor®) , omeprazol (Losec®) en af en toe temazepam (Normison®). Is er een mogelijke relatie met de geneesmiddelen? Welk van onderstaande antwoorden is/ zijn goed?
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1. ja, metoprolol kan depressieve klachten veroorzaken.</li> <li><input type="checkbox"/> 2. ja, metoprolol kan duizeligheid of sufheid veroorzaken, waardoor meneer de deur niet meer uit durft.</li> <li><input type="checkbox"/> 3. ja, temazepam kan depressieve klachten veroorzaken.</li> <li><input type="checkbox"/> 4. ja, temazepam kan duizeligheid of sufheid veroorzaken, waardoor meneer de deur niet meer uit durft.</li> <li><input type="checkbox"/> 5. ja, omeprazol kan depressieve klachten veroorzaken.</li> <li><input type="checkbox"/> 6. ja, omeprazol kan duizeligheid of sufheid veroorzaken, waardoor meneer de deur niet meer uit durft.</li> </ul>

<b>23.</b>	Mevrouw Q. slikt furosemide (Lasix®)en digoxine (Lanoxin®). De huisarts wil, dat haar kalium spiegel regelmatig bepaald wordt. Waarom?
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1.om een te lage kaliumspiegel op tijd te ontdekken.</li> <li><input type="checkbox"/> 2.om een te hoge kaliumspiegel op tijd te ontdekken.</li> <li><input type="checkbox"/> 3.bepalen van de kaliumspiegel is onnodig.</li> </ul>

<b>24.</b>	Hart-ritmestoornissen en spierzwakte zijn een gevolg van: Welk van onderstaande antwoorden is/ zijn goed?
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1. te lage kaliumspiegel</li> <li><input type="checkbox"/> 2. te hoge kaliumspiegel</li> <li><input type="checkbox"/> 3.te lage calciumspiegel</li> <li><input type="checkbox"/> 4.te hoge calciumspiegel</li> <li><input type="checkbox"/> 5.te lage magnesiumspiegel</li> <li><input type="checkbox"/> 6.te hoge magnesiumspiegel</li> </ul>


<b>25.</b>	Meneer R. gebruikt al enkele jaren dagelijks lactulosestroop (Duphalac®, Legendal®) i.v.m. verstopping. Welke bijwerkingen kan lactulosestroop hebben? Welk van onderstaande antwoorden is/ zijn goed?										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 1. hoofdpijn</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 2. duizeligheid</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 3. wazig zien</td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 4. veel dromen</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 5. koude handen en voeten</td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 6. maag- en darmklachten</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 7. moeheid en vergeetachtigheid</td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 8. huiduitslag</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 9. veel plassen</td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 10. bronchospasmen</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 1. hoofdpijn	<input type="checkbox"/> 2. duizeligheid	<input type="checkbox"/> 3. wazig zien	<input type="checkbox"/> 4. veel dromen	<input type="checkbox"/> 5. koude handen en voeten	<input type="checkbox"/> 6. maag- en darmklachten	<input type="checkbox"/> 7. moeheid en vergeetachtigheid	<input type="checkbox"/> 8. huiduitslag	<input type="checkbox"/> 9. veel plassen	<input type="checkbox"/> 10. bronchospasmen
<input type="checkbox"/> 1. hoofdpijn	<input type="checkbox"/> 2. duizeligheid										
<input type="checkbox"/> 3. wazig zien	<input type="checkbox"/> 4. veel dromen										
<input type="checkbox"/> 5. koude handen en voeten	<input type="checkbox"/> 6. maag- en darmklachten										
<input type="checkbox"/> 7. moeheid en vergeetachtigheid	<input type="checkbox"/> 8. huiduitslag										
<input type="checkbox"/> 9. veel plassen	<input type="checkbox"/> 10. bronchospasmen										

<b>26.</b>	Meneer R. slikt ook furosemide (Lasix®). De laatste dagen heeft hij last van diarree. Welk van de onderstaande uitspraken is/ zijn goed?						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="padding: 5px;">1. de diarree wordt veroorzaakt door de lactulosestroop.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="padding: 5px;">2. de diarree wordt veroorzaakt door de furosemide.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="padding: 5px;">3. meneer loopt kans op uitdroging door de combinatie van furosemide en diarree.</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	1. de diarree wordt veroorzaakt door de lactulosestroop.	<input type="checkbox"/>	2. de diarree wordt veroorzaakt door de furosemide.	<input type="checkbox"/>	3. meneer loopt kans op uitdroging door de combinatie van furosemide en diarree.
<input type="checkbox"/>	1. de diarree wordt veroorzaakt door de lactulosestroop.						
<input type="checkbox"/>	2. de diarree wordt veroorzaakt door de furosemide.						
<input type="checkbox"/>	3. meneer loopt kans op uitdroging door de combinatie van furosemide en diarree.						


<b>27.</b>	Meneer R. krijgt vervolgens last van moeheid, spierkrampen, misselijkheid en sufheid. Welk van onderstaande antwoorden is/ zijn goed?								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="padding: 5px;">1. Dit zijn bijwerkingen van lactulosestroop</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="padding: 5px;">2. Dit zijn bijwerkingen van furosemide.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="padding: 5px;">3. Dit is een gevolg van uitdroging.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="padding: 5px;">4. Dit heeft andere oorzaken.</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	1. Dit zijn bijwerkingen van lactulosestroop	<input type="checkbox"/>	2. Dit zijn bijwerkingen van furosemide.	<input type="checkbox"/>	3. Dit is een gevolg van uitdroging.	<input type="checkbox"/>	4. Dit heeft andere oorzaken.
<input type="checkbox"/>	1. Dit zijn bijwerkingen van lactulosestroop								
<input type="checkbox"/>	2. Dit zijn bijwerkingen van furosemide.								
<input type="checkbox"/>	3. Dit is een gevolg van uitdroging.								
<input type="checkbox"/>	4. Dit heeft andere oorzaken.								




<b>28.</b>	Mevrouw S. slikt carbasalaatcalcium (Ascal®)100 mg 1x daags. Welke bijwerkingen kan dit geven? Welk van onderstaande antwoorden is/ zijn goed?																				
	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1. hoofdpijn</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2. duizeligheid</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>3. wazig zien</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4. veel dromen</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5. koude handen en voeten</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>6. maagpijn</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>7. moeheid en vergeetachtigheid</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>8. huiduitslag</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>9. veel plassen</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10. bronchospasmen</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	1. hoofdpijn	<input type="checkbox"/>	2. duizeligheid	<input type="checkbox"/>	3. wazig zien	<input type="checkbox"/>	4. veel dromen	<input type="checkbox"/>	5. koude handen en voeten	<input type="checkbox"/>	6. maagpijn	<input type="checkbox"/>	7. moeheid en vergeetachtigheid	<input type="checkbox"/>	8. huiduitslag	<input type="checkbox"/>	9. veel plassen	<input type="checkbox"/>	10. bronchospasmen
<input type="checkbox"/>	1. hoofdpijn	<input type="checkbox"/>	2. duizeligheid																		
<input type="checkbox"/>	3. wazig zien	<input type="checkbox"/>	4. veel dromen																		
<input type="checkbox"/>	5. koude handen en voeten	<input type="checkbox"/>	6. maagpijn																		
<input type="checkbox"/>	7. moeheid en vergeetachtigheid	<input type="checkbox"/>	8. huiduitslag																		
<input type="checkbox"/>	9. veel plassen	<input type="checkbox"/>	10. bronchospasmen																		

<b>29.</b>	Meneer T. is 87 jaar oud. Hij slikt al jaren digoxine (Lanoxin®), 0,125 mg 1x daags en acetylsalicylzuur, 80 mg 1x daags. De laatste maanden is hij erg vermagerd. De laatste tijd heeft hij last van geheugenverlies en is hij verward. Welk van onderstaande antwoorden is/ zijn goed?								
	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1. Verwardheid hoort bij de leeftijd.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2. Verwardheid is een gevolg van vitaminedekort</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>3. Dit kan wijzen op een digoxine-intoxicatie</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4. Dit kan wijzen op een acetylsalicylzuurintoxicatie.</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	1. Verwardheid hoort bij de leeftijd.	<input type="checkbox"/>	2. Verwardheid is een gevolg van vitaminedekort	<input type="checkbox"/>	3. Dit kan wijzen op een digoxine-intoxicatie	<input type="checkbox"/>	4. Dit kan wijzen op een acetylsalicylzuurintoxicatie.
<input type="checkbox"/>	1. Verwardheid hoort bij de leeftijd.								
<input type="checkbox"/>	2. Verwardheid is een gevolg van vitaminedekort								
<input type="checkbox"/>	3. Dit kan wijzen op een digoxine-intoxicatie								
<input type="checkbox"/>	4. Dit kan wijzen op een acetylsalicylzuurintoxicatie.								

<b>30.</b>	Vanwege vermoeidheidsverschijnselen laat de huisarts een bloedonderzoek doen. Het Hb van meneer T. blijkt te laag. Welk van onderstaande antwoorden is/ zijn goed?								
	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1. laag Hb hoort bij de leeftijd</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2. laag Hb is het gevolg van een vitaminedekort.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>3. laag Hb kan bijwerking zijn van digoxine.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4. laag Hb kan bijwerking zijn van acetylsalicylzuur.</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	1. laag Hb hoort bij de leeftijd	<input type="checkbox"/>	2. laag Hb is het gevolg van een vitaminedekort.	<input type="checkbox"/>	3. laag Hb kan bijwerking zijn van digoxine.	<input type="checkbox"/>	4. laag Hb kan bijwerking zijn van acetylsalicylzuur.
<input type="checkbox"/>	1. laag Hb hoort bij de leeftijd								
<input type="checkbox"/>	2. laag Hb is het gevolg van een vitaminedekort.								
<input type="checkbox"/>	3. laag Hb kan bijwerking zijn van digoxine.								
<input type="checkbox"/>	4. laag Hb kan bijwerking zijn van acetylsalicylzuur.								

<b>31.</b>	Bij navraag blijkt meneer T. last te hebben van enigszins zwartgekleurde ontlasting. Welk van onderstaande antwoorden is/ zijn goed?								
	<table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>1.dit is een bijwerking van digoxine.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2.dit is een bijwerking van acetylsalicylzuur.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>3.dit wijst op bloedverlies in het maagdarmkanaal.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>4.dit wijst op aambeien.</td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	1.dit is een bijwerking van digoxine.	<input type="checkbox"/>	2.dit is een bijwerking van acetylsalicylzuur.	<input type="checkbox"/>	3.dit wijst op bloedverlies in het maagdarmkanaal.	<input type="checkbox"/>	4.dit wijst op aambeien.
<input type="checkbox"/>	1.dit is een bijwerking van digoxine.								
<input type="checkbox"/>	2.dit is een bijwerking van acetylsalicylzuur.								
<input type="checkbox"/>	3.dit wijst op bloedverlies in het maagdarmkanaal.								
<input type="checkbox"/>	4.dit wijst op aambeien.								

<b>32.</b>	Mevrouw U. is 88 jaar. Vanwege angst schrijft de huisarts haar oxazepam (Seresta®), 10 mg 3 x daags voor. Na een paar dagen durft mevrouw niet meer uit bed te komen, omdat ze te verward is.				
	<table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>1. de dosering oxazepam is waarschijnlijk te laag.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2. de dosering oxazepam is waarschijnlijk te hoog.</td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	1. de dosering oxazepam is waarschijnlijk te laag.	<input type="checkbox"/>	2. de dosering oxazepam is waarschijnlijk te hoog.
<input type="checkbox"/>	1. de dosering oxazepam is waarschijnlijk te laag.				
<input type="checkbox"/>	2. de dosering oxazepam is waarschijnlijk te hoog.				

<b>33.</b>	Meneer V. is 83 jaar. Hij slikt al 20 jaar metoprolol (Selokeen®, Lopresor®). De laatste tijd droomt hij veel en daarom slaapt hij slecht.				
	<table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>1. het slechte slapen hoort bij de leeftijd.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2. het slechte slapen is een bijwerking van metoprolol.</td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	1. het slechte slapen hoort bij de leeftijd.	<input type="checkbox"/>	2. het slechte slapen is een bijwerking van metoprolol.
<input type="checkbox"/>	1. het slechte slapen hoort bij de leeftijd.				
<input type="checkbox"/>	2. het slechte slapen is een bijwerking van metoprolol.				

## Houding

34.	Als laatst nog een aantal stellingen. Beoordeel elke stelling afzonderlijk en onafhankelijk. Pieker niet over een individueel item. Uw eerste indruk over de stelling is van belang. Sla geen enkel item over!				
		zeer mee oneens			zeer mee eens
	Ik ervaar handelingen ten aanzien van medicatie soms als stressvol.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Ik voel me niet zeker als ik onverwacht een patient moet ondersteunen bij medicatie toediening.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Als ik tijdens een bezoek aan een patient opmerk dat deze de medicatie niet op juist manier inneemt voel ik me er verantwoordelijk voor dat dit verandert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Als een patient de medicatie niet op tijd inneemt is dit zijn/ haar eigen verantwoordelijkheid.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Ik voel me zeker als ik handelingen ten aanzien van medicatie uitvoer.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Ik heb soms het gevoel dat ik een patient foutief voorlicht over medicatie gerelateerde zaken.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Als ik een situatie niet vertrouwd neem ik direct contact op met de huisarts of apotheker.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Ik ben niet de aangewezen persoon om mogelijke bijwerkingen van medicatie te signaleren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Door tijdig ingrijpen kan ik een ziekenhuisopname voorkomen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>